



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

pFastBac1-C-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)


产品编号	产品名称	包装
D2804-1μg	pFastBac1-C-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	1μg
D2804-100μg	pFastBac1-C-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	100μg

产品简介:

- pFastBac1-C-EGFP, 全称为pFastBac1-PreScission-C-EGFP-His-tag-Strep-tag, 是碧云天自行研发的以pFastBac1为基础构建的用于昆虫细胞表达目的蛋白C端融合有EGFP蛋白的质粒。本质粒含有polyhedrin (PH)启动子, 可以高效启动目的蛋白和EGFP融合蛋白在昆虫细胞(如Sf9和Sf21等)中的表达, 其表达的EGFP有很强的绿色荧光, 在显微镜下可以非常方便地观察目的蛋白的表达情况。同时EGFP的C端含有编码8×His标签的序列和编码短肽亲和标签Strep-tag II的序列, 因此可以非常便捷地使用镍柱或Strep-Tactin系统进行分离纯化。同时目的蛋白和EGFP之间含有PreScission酶切位点, 便于后续酶切去除标签。
- **和EGFP融合表达, 便于观察表达水平。**采用Bac-to-Bac杆状病毒表达系统表达目的蛋白时, 通常仅仅是根据细胞被杆状病毒感染的外部形态来判断目的蛋白的表达情况, 因此很容易出现收集病毒时间过早或过晚而导致的目的蛋白表达水平偏低或活性下降的问题。将目的蛋白构建成EGFP的融合表达蛋白, 因为后者有很强的绿色荧光, 在荧光显微镜下可以非常方便地观察目的蛋白的表达效果从而可以有效避免上述问题的发生。
- **His和Strep-tag II双标签系统, 便于分离纯化。**pFastBac1-C-EGFP表达的目的蛋白EGFP融合蛋白的C端含有编码8×His标签的序列, 因此可以非常便捷地使用镍柱进行分离纯化, 也可以使用His标签抗体来识别目的蛋白融合蛋白的表达。同时, 本质粒表达的目的蛋白EGFP融合蛋白的C端还含有短肽亲和标签Strep-tag II的序列。Strep-tag II是由8个氨基酸(WSHPQFEK)构成的短肽序列, 在生理条件下可通过Strep-Tactin纯化介质高选择性地对Strep-tag II融合蛋白进行亲和纯化, 该标签的纯化条件比较温和, 能很好地保持目的蛋白的生物活性, 并仅通过一步亲和层析后就有可能获得超过99%纯度的目的蛋白。
- **带有PreScission位点, 便于去除标签。**本质粒表达的融合蛋白, 在目的蛋白和EGFP蛋白之间有PreScission蛋白酶识别的八肽序列LEVLFQGP, 因此在目的蛋白纯化后或纯化的同时可以利用PreScission蛋白酶切除目的蛋白C端的EGFP蛋白、8×His标签以及Strep-tag II标签。PreScission蛋白酶酶切发生在八肽序列的Q和G之间, 如果目的蛋白基因是通过无缝克隆的方法以最理想的方式克隆在PreScission酶切位点之后, 那么目的蛋白的N端可以只留下两个额外的氨基酸残基GP。
- pFastBac1-C-EGFP是基于Bac-to-Bac杆状病毒表达系统(Bac-to-Bac Baculovirus Expression System)而设计的表达载体。Bac-to-Bac杆状病毒表达系统是由Luckow等人于1993年发展的一种快速而有效产生重组杆状病毒的方法。该系统主要包括以下两个组分: (1)用于插入目的基因的pFastBac载体, 目的基因如EGFP等插入后受杆状病毒特异性启动子(baculovirus-specific promoter) polyhedrin启动子调控表达; (2)含杆状病毒穿梭载体bacmid (bMON14272, 136kb)和辅助质粒(helper plasmid, 用于表达转座必须的转座蛋白)的大肠杆菌DH10Bac宿主菌株(D0346)。将pFastBac重组质粒转化该菌株可发生pFastBac重组质粒中mini-Tn7元件和bacmid上的mini-attTn7发生转座, 从而形成重组的bacmid。位点特异的转座会破坏宿主的lacZα基因, 从而可通过蓝白斑筛选重组克隆。PCR等方法鉴定重组克隆后, 提取重组的bacmid转染昆虫细胞, 可以产生重组杆状病毒, 并表达目的蛋白和融合蛋白。扩增重组的杆状病毒并感染昆虫细胞, 就可以大量表达纯化目的蛋白了。
- 本质粒为氨苄青霉素抗性。
- pFastBac1-C-EGFP质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide	Position
f1 origin	2-457
Ampicillin resistance gene	589-1449
pUC origin	1620-2208
Tn 7R	2511-2735
Gentamicin resistance gene	2802-3335
Polyhedrin promoter (P _{PH})	3904-3995
Multiple cloning site	4032-4073
PreScission	4074-4097
EGFP sequence	4098-4814
8×His Tag	4815-4838
Strep-tag II	4851-4874
SV40 polyadenylation signal	5007-5141
Tn 7L	5170-5335

➤ pFastBac1-C-EGFP质粒(5517bp)的图谱如下：



➤ pFastBac1-C-EGFP的详细图谱如下：

	BamHI	BglII	EcoRI	SalI	XbaI
4011	TACCGTCCCA	CCATCGGGCG	CGGATCCAGA	TCTGAATTCG	TCGACTCTAG
	ATGGCAGGGT	GGTAGCCCGC	GCCTAGGTCT	AGACTTAAGC	AGCTGAGATC
	PreScission				
	PstI	XhoI	EGFP sequence		
4061	ACTGCAGCTC	GAGCTGGAAG	TTCTGTTCCA	GGGTCCTATG	GTGAGCAAGG
	TGACGTCGAG	CTCGACCTTC	AAGACAAGGT	CCCAGGATAC	CACTCGTTCC
4111	GCGAGGAGCT	GTTACACGGG	GTGGTGCCCA	TCCTGGTCGA	GCTGGACGGC
	CGCTCCTCGA	CAAGTGCCCC	CACCACGGGT	AGGACCAGCT	CGACCTGCCG
4161	GACGTAAACG	GCCACAAGTT	CAGCGTGTCC	GGCGAGGGCG	AGGGCGATGC
	CTGCATTTGC	CGGTGTTCAA	GTCGCACAGG	CCGCTCCCGC	TCCCCTACG
4211	CACCTACGGC	AAGCTGACCC	TGAAGTTCAT	CTGCACCACC	GGCAAGCTGC
	GTGGATGCCG	TTCGACTGGG	ACTTCAAGTA	GACGTGGTGG	CCGTTTCGACG
4261	CCGTGCCCTG	GCCCACCCTC	GTGACCACCC	TGACCTACGG	CGTGCAGTGC
	GGCACGGGAC	CGGGTGGGAG	CACTGGTGGG	ACTGGATGCC	GCACGTCACG
4311	TTCAGCCGCT	ACCCCGACCA	CATGAAGCAG	CACGACTTCT	TCAAGTCCGC
	AAGTCGGCGA	TGGGGCTGGT	GTACTTCGTC	GTGCTGAAGA	AGTTCAGGCG
4361	CATGCCCGAA	GGCTACGTCC	AGGAGCGCAC	CATCTTCTTC	AAGGACGACG
	GTACGGGCTT	CCGATGCAGG	TCCTCGCGTG	GTAGAAGAAG	TTCCTGCTGC

BseYI	C`CCAG, C	1960	PpuMI	RG`GWC, CY	4092
BsmBI	CGTCTCN`NNNN,	3182	PspXI	VC`TCGA, GB	4068
BspQI	GCTCTTCN`NNN,	2381	PstI	C, TCGA`G	4066
BstBI	TT`CG, AA	4867	PvuI	CG, AT`CG	1007
BstZ17I	GTA TAC	3884	SacII	CC, GC`GG	2768
Eco0109I	RG`GNC, CY	4092	SalI	G`TCGA, C	4050
EcoRI	G`AATT, C	4044	SapI	GCTCTTCN`NNN,	2381
EcoRV	GAT ATC	2825	SnaBI	TAC GTA	3881
Esp3I	CGTCTCN`NNNN,	3182	TfiI	G`AWT, C	2290
FalI	, (N) ₅ `(N) <sub>8</sub> AAG(N) <sub>5</sub> CTT(N) <sub>8</sub> , (N) <sub>5</sub> `	4575	Tth111I	GACN`N, NGTC	3228
FspI	TGC GCA	1153	XbaI	T`CTAG, A	4056
HindIII	A`AGCT, T	4878	XhoI	C`TCGA, G	4068

- pFastBac1-C-EGFP质粒可使用的测序引物序列如下：
pFastbac-F primer (3995-4014): 5'-TAT TCC GGA TTA TTC ATA CC-3'
pFastBac-R primer (4909-4927): 5'-ACA AAT GTG GTA TGG CTG A-3'
- pFastBac1-C-EGFP的全序列信息请参考碧云天的网站上该质粒的信息。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
D2804-1μg	pFastBac1-C-EGFP	1μg
D2804-100μg	pFastBac1-C-EGFP	100μg
—	说明书	1 份

保存条件：
-20℃保存。

- 注意事项：
- 本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
 - 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
 - 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

- 使用说明：
- 首次使用1μg包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。
 - 100μg包装的产品浓度见标签，可以直接用于酶切或者转染细胞。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
D2802	pFastBac1-EGFP (杆状病毒包装阳性对照质粒)	1μg
D2804	pFastBac1-C-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	1μg/100μg
D2805	pFastBac1-N-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	1μg/100μg
D0031	杆状病毒穿梭载体bacmid小量抽提试剂盒	50次
D0346	DH10Bac甘油菌(重组Bacmid制备用菌株)	200μl
C0551-0.5ml	LipoInsect™转染试剂	0.5ml
C0551-1.5ml	LipoInsect™转染试剂	1.5ml
C0551-7.5ml	LipoInsect™转染试剂	7.5ml
P2151-1ml	BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠)	1ml
P2151-5ml	BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠)	5ml
P2151-200μl	BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠)	200μl
P2302	PreScission Protease	100U
P2303	PreScission Protease	500U
P2229S	His标签蛋白纯化试剂盒(耐变性剂型)	10ml
P2226	His标签蛋白纯化试剂盒(耐还原螯合型)	10ml
P2233-10ml	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐变性剂型)	10ml
P2233-100ml	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐变性剂型)	100ml
P2233-1000ml	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐变性剂型)	1000ml

P2210	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐还原螯合型)	10ml
P2218	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐还原螯合型)	100ml
P2220	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐还原螯合型)	1000ml
A0303	辣根过氧化物酶标记Streptavidin	0.2ml
AF0159	GFP Mouse Monoclonal Antibody	50μl
AF5066	GFP Tag Rabbit Polyclonal Antibody	50μl
AG279	GFP抗体(兔多抗)	>40次
AG281	GFP抗体(小鼠单抗)	>40次
AF5060	His Tag Mouse Monoclonal Antibody	50μl
AH367	His-tag抗体(小鼠单抗)	>20次

Version 2024.12.20